

UNE ARALIACÉE ÉNIGMATIQUE :
LE SCHEFFLERA STELZERIANA HORT.

Par A. GUILLAUMIN.
PROFESSEUR AU MUSÉUM

L'Heptapleurum stelznerianum Hort., cultivée sur la Côte d'Azur depuis plus de quarante ans, est mentionnée dans la première édition du *Kew Hand List, Tender Dicotyledons*, p. 349 (1900) sans indication de provenance ; dans l'*Hortus Mortolensis*, p. 288 (1912), A. Berger la classe sans description dans les *Schefflera* sous le nom de *S. Stelzneriana* Hort., binôme admis dans la 2^e édition du *Kew Hand List : Tender Dicotyledons*, p. 178 (1931), toujours sans indication de patrie. Ces noms se sont pas relevés dans l'*Index Kewensis* et ses suppléments, pas davantage, dans les *List of published names of plants introduced to cultivation* du *Kew Bulletin*. R. Viguier, pas plus que Harms, ne l'ont étudiée dans leurs Recherches sur les Araliacées ; l'espèce est donc restée énigmatique si bien qu'il peut y avoir intérêt à en donner une description d'après un pied qui a fleuri au Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), dans la propriété des Cèdres à M. J. Marnier-Lapostolle qui le tenait de Robertson-Prochowski, aux Tropiques, à Nice.

Arbuste ressemblant au *Schefflera venulosa* Harms, haut de 6-7 m., pouvant devenir semi-grimpant et même avoir tendance à émettre des racines adventives au contact d'un mur ; après floraison ou à la suite d'une taille, la tige produit 2 ou 3 bourgeons donnant naissance à des branches. Feuilles alternes, composées-palmées à 7 folioles ; pétiole assez grêle (3 mm. de diamètre), long de 25 cm. environ, sans lenticelles, présentant à la base des stipules soudées en lame intrapétiolaire longue de 2 cm., appliquée sur la tige ; pétiolules longs de 3-6 cm. ; limbes un peu épais, ovales ou ovales-allongés (jusqu'à 15 cm. \times 8 cm.), vert jaunâtres, arrondis à la base, obtus à acuminés ou même sub-caudés aigus au sommet, nervures : la médiane proéminente à la face inférieure, les 6-8 latérales saillantes en dessous de même que les veines. Inflorescence terminale, dénudée, axe couvert seulement de bractées semblables aux stipules des feuilles dont le pétiole serait réduit à une pointe courte ne dépassant pas 3 mm. de longueur ; rameaux noirs, ne dépassant pas 12 cm. de longueur, fleurs noires, globuleuses, en grappes d'ombelles à pédoncules longs de 5 mm. ; pédicelles longs

de 2 mm. ; calice en coupe pentagonale ; pétales 5, ovales-triangulaires longs de 2 mm., à quelques longs poils laineux en dehors ; étamines 5, à filets filiformes un peu plus longs que l'anthere à 4 sacs polliniques s'ouvrant par 2 fentes longitudinales ; ovaire à 5 loges ; styles extrêmement courts, soudés complètement et enfoncés dans le disque recouvrant l'ovaire. Fleurit chaque année mais n'a jamais donné de fruits.